

Nedenstående et ekstrakt af Alistairs forslag til forøget indsats/tiltag fra STRI-rapport 15. maj 2018:

Nyt vandingsanlæg og indspil green bliver behandlet særskilt og beskrives ikke her?

Greens:

Hvis/når greens er for hurtige, - kan øgning af prikning med 8 mm massive spyd hjælpe til reduktion af fastheden. (evt. kun i den forreste greendel)

Øgning af K (kalium ved gødkning)

PG, 1, 12 og 18 greens er tynde og svage m.v.

- *PG., 1. og 18 domineres af enårig-rapgræs samt en svag græsbestand pga. hjortebeskadigelse og Fusarium-sygdom.*

Let gødkning, topdress og eftersåning med en hvene kulturvar af høj kvalitet (Lån en Float-enhed fra Ian Tomlinson).

- *På 12. er Rødsvingel dominerende, men med en tynd tæthed.*

Det tilrådes med let gødkning, eftersåning med alm. Hvene og begrænset mængde Smithco jern.

Green omgivelser (Green collars, approaches og surrounds):

Øgning af fastheden for greentilgangen (approaches), så de følger greens nøglepleje. - Topdress, luftning, lette gødskninger og behandling med afspændingsmidler.

Vand de marginale områder, bl.a. bunkerkanter og rundt om sprinklerhoveder ved greens, når de tørre ud, og overvej håndvanding med tilkoblet afspændingsmidler. – under alle omstændigheder bør områderne indgå i et fastlagt afspændingsmiddelsprogram med en bred anvendelse af afspændingsmiddels produkter af god kvalitet?

Udfordring med uønsket vækst så som hvidkløver og vejbred m.v., dette er især udbredt i områder hvor fodtrafik er koncentreret f.eks. ved venstre side af 18. m.v. – Hvordan får vi kontrol med dette?

- Jernsulfat, let gødkning, eftersåning og hvile i efterår/vintermånederne? -

Fairways:

Udbringning af ca. 250 tons sand 2 – 3 gange om året fortsættes?

Græsbestanden er for åben og gødskningen skal øges. NPK 10:1:9

Kvaliteten af klipningen skal forbedres, - øgning af klippefrekvensen og børstning kan afhjælpe.

Prik såning med rødsvingel i sen sæsonen.