

Anbefalinger som komitéen ser, ud fra Alistair Beggs rapport 2022, er som følger:

Hovedkonklusion:

- Den eksisterende strategi og pleje kan forbedres. Her er det overordnede budskab at gøre mere af den eksisterende pleje, hvor frekvens og præcision, nok er vigtigere end voldsomheden.
- For at afspejle det niveau som Banekomiteén/Bestyrelsen ønsker at banen skal præstere på, vil Alistair Beggs anbefale en justering af banebemandingen.

Hovedpointer:

Anbefalinger til den nuværende pleje m.m.:

Greens:

- Rødsvingel (græs) skal styrkes ved en markant øgning af gødning/næringsstoffer for at styrke græsset.
- Plejetiltag skal generelt øges og derudover målrettes efter behov på specifikke områder.
- Det anbefales at efterså med 50:50 rødsvingel/alm. hvene, primært på svage green områder.

Greenomgivelser:

Samme plejetiltag som på greens (her lidt mere voldsomt).

Fairways:

Fortsæt plejetiltagene fra 2021-2022 hvor der dog stadig er plads til forbedringer ved øgning og raffinering af plejetiltag.

Semirough og teesteder:

Her er eneste bemærkning at teestederne skal være faste, flade og ryddelige og dette opnås ved yderligere plejetiltag.

Banebemanding:

Banebemandingen af kvalificerede medarbejdere er for lavt og det anbefales at øge denne kernestab for derefter at supplere med vikarer om sommeren efter behov.

Herudover flere anbefalinger der er præciseret i Alistair Beggs rapport og igen i komitéens ekstrakt af denne.

NB Ovenstående er banekomiteéns konklusion ud fra Alistair Beggs rapport og Banekomiteéns opsummering der inkluderer Martin Nilsson svar på handlinger og forbehold til anbefalingerne.

Alistair med svar på opfølgende spørgsmål til agronomrapport 2022:

- 1) Din anbefaling til brug af topdressing på 900 tons er det for fairways alene eller på hele golfbanen?
I punkt 1 under Fairways foreslår jeg mindst 500 tons om året som vejledning opdelt i to 250 tons applikationer.
- 2) pH på fairways er lav. Vil du anse dette for at være en faktor for skadelig græsvækst og etablering? Skal vi være bange for dette lave niveau?
Jeg er ikke sikker på, hvor lav pH på fairways er, men uanset niveauet er pH svært at ændre, og jeg vil ikke anbefale at prøve at gøre det. Kalkning kan forårsage alle mulige andre problemer, herunder flere orme og mere ukrudt! På nogle måder er en lav pH god, fordi det vil bidrage til at holde produktiviteten under kontrol, men som vi diskuterede, er noget ekstra gødning for at øge produktivitet nødvendigt, da det giver en tæthed der udelukker ukrudt.
- 3) Hvorfor går du ikke ind for brugen af krybende vene på vores problemgreens (1,18 og puttinggreen) ud over brugen af rødsvingel og alm. vene?
Jeg siger ikke, at du ikke kan bruge krybende vene, men efter min erfaring fungerer alm. vene bedre i nordeuropæiske klimaer. Jeg ved, at teknologien ændrer sig, og jeg forstår, at du ønsker at eksperimentere lidt, men som hovedregel har disse krybende sorter brug for masser af solskin, og jeg er ikke sikker på, at 1 og 18 får nok til, at de klarer sig godt.
- 4) Din anbefaling om et nitrogen/kalium-forhold på 1:1. Betyder det også for fairways, surrounds og tees?
Dette er en god tommelfingerregel for styret græs som helhed. Det er klart, at hvis afklip returneres til området, er det mindre vigtigt der. I disse situationer er kvælstof alene sandsynligvis tilstrækkeligt?
- 5) Vil du uddybe din anbefaling af bemandingsniveauer?
Bemandingsniveauet skal afspejle det niveau, som komitéen/bestyrelsen ønsker banen præsentere på. Det er klart, at i de senere år, med tabet af kemiske løsninger, er forvaltningen af banen blevet mere arbejdskrævende, fordi operationer som ukrudtsbekæmpelse nu i nogle tilfælde skal udføres manuelt eller har brug for mere gentagen opmærksomhed, end de gjorde før. Du vil bedre end mig kende kravene gennem efterårs-, vinter- og forårsmånederne, men for et anlæg af denne kaliber, der stræber efter at være den bedste bane i Danmark med den bedste stamtavle, ville en kvalificeret kernestab på minimum 7-8 virke fornuftig for derefter at blive fyldt op efter behov om sommeren for at tilføje den nødvendige opmærksomhed på detaljer. Kvalitetsbaner i Storbritannien vil have dette personalegrundlag og nogle baner med mål for et endnu højere niveau, vil have flere.
- 6) Anbefaler du en 50:50 sammensætning blanding af Rødsvingel og alm. vene på greens?
Fordi det alm. vene frø er mindre end rødsvingel frø, er det normalt en 80:20 blanding efter vægt, hvilket vil give et omtrentligt antal frø på 50:50 i jorden. Jeg ville foretrække alm. vene i de varmere måneder og rødsvingel i skuldermånederne, men jeg har set alm. vene spire godt i køligere forårsjord, hvis spilleniveauet er let.
- 7) OM-niveauet på 16' green er højt. Skal vi tage fat på dette med det samme, eller er det noget, vi bare skal holde øje med?
Det er ikke desperat højt på 6,8%, jeg ville holde øje med det og se, hvordan tendensen er i løbet af de næste par år.